




ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami


Pozyskuj świnię i paszę z godnych zaufania gospodarstw

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii.



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/ #StopASF

 **efsa**
European Food Safety Authority



ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Wykryj objawy.

Gorączka

Utrata apetytu

Utrata energii

Krwawienie

Wymioty


Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii.



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/ #StopASF

 **efsa**
European Food Safety Authority



ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Wykryj objawy.

Gorączka

Utrata apetytu

Utrata energii

Krwawienie

Wymioty


Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii.




www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/ #StopASF

 **efsa**
European Food Safety Authority



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?



Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skrzęty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj** - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!